

Metadato elaborado por el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (Iplaneg)

Nombre del indicador:	Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar que curan al terminar el tratamiento.
Definición:	Es el porcentaje de casos nuevos de tuberculosis pulmonar diagnosticados por bacteriología que ingresan a tratamiento y que son clasificados al final del mismo con Éxito Terapéutico (suma de los casos curados más los que terminaron tratamiento).
Algoritmo:	$CTBP_1 = \left(\frac{CCTTx_1}{CTX_1} \right) 100$ <p>Significado de las siglas o abreviaturas:</p> <p>CTBP₁: Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar (TBP) diagnosticados por bacteriología, que concluyen exitosamente su tratamiento en el año t,</p> <p>CCTTx₁: Casos nuevos de TBP diagnosticados por bacteriología, que son clasificados al concluir su tratamiento como curados y con tratamiento terminado en el año t, y</p> <p>CTX₁: Total de casos de tuberculosis pulmonar diagnosticados por bacteriología que ingresaron a tratamiento en el año t.</p>
Fuente generadora de la información estadística utilizada para el cálculo del indicador:	Secretaría de Salud (SS). Dirección General de Epidemiología (DGEPI). Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) Plataforma Única.
Unidad de medida:	Porcentaje.
Cobertura geográfica:	Nacional y entidad federativa.
Referencia temporal:	2000 - 2013.
Periodicidad:	Anual.
Fecha en que se espera generar el indicador:	Octubre de 2015.
Fecha de actualización:	17 de octubre de 2014.
Institución responsable de calcular el indicador:	Secretaría de Salud (SS). Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE). Dirección General de Epidemiología (DGEPI).
Importancia y utilidad del indicador:	La importancia y utilidad de este indicador radica en que permite conocer la efectividad de los tratamientos administrados a las personas que padecen esta enfermedad, así como el monto anual de los tratamientos administrados con la finalidad de poder realizar estimaciones de años futuros para realizar una adecuada planeación.
Referencia internacional:	Organización Mundial de la Salud (OMS). http://www.who.int/topics/tuberculosis/es/ . Organización Panamericana de la Salud (OPS). http://www.paho.org/Spanish/DD/PUB/PC_591.htm .
Observaciones:	En México el término "tratamiento breve bajo observación directa" no se utiliza, la estrategia en nuestro país se denomina "Tratamiento acortado estrictamente supervisado (TAES)". En el Éxito Terapéutico se consideran a los pacientes curados (casos que terminan su tratamiento asintomáticos y con baciloscopia negativa en los dos últimos meses o cultivo negativo al final del tratamiento) más los pacientes con término de tratamiento (casos que terminan su tratamiento asintomáticos, pero no se realizó baciloscopia o cultivo al final del tratamiento) de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana y al Plan Mundial para detener la tuberculosis. La información de este indicador se presenta a partir de 2000, año en el que se tiene una información más consistente a nivel nacional.